

Date: 17th July-2026**ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ЧАСТОТА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ****Каршиев Ш.Г.**

Alfraganus University

Самаркандский государственный медицинский университет

Анализ лечебной тактики у пациентов с множественными переломами челюстно-лицевой области показал преобладание малоинвазивных методов, направленных на восстановление анатомической целостности костных структур при минимизации риска осложнений. Закрытая репозиция использовалась у 68% пациентов и оказалась эффективной при стабильных переломах без значительного смещения, обеспечивая снижение травматичности, сокращение времени операции, раннее начало функциональной реабилитации и уменьшение риска инфекционных осложнений. Открытая репозиция с внутренней фиксацией (ORIF) применялась у 24% пациентов при сложных, многооскольчатых или смещённых переломах. Использование минипластин и винтов позволяло восстановить анатомические контуры лицевого скелета, обеспечивать раннюю функциональную нагрузку и профилактику нарушений прикуса, что подтверждает современный подход к реконструктивной хирургии как «золотой стандарт». Консервативное лечение (8%) использовалось при ограниченных повреждениях или при противопоказаниях к оперативным вмешательствам, включая функциональный покой, медикаментозную терапию и динамическое наблюдение, что требует строгого контроля для предотвращения вторичного смещения костных фрагментов.

Анализ послеоперационных осложнений после дентальной имплантации показал суммарную частоту неблагоприятных исходов 10%. Наиболее часто встречался периимплантит (3,2%), мукозит (2,4%) и отторжение имплантата (1,6%), реже — кровотечения, расхождение швов, повреждения нервов и перфорация верхнечелюстной пазухи. Осложнения были обусловлены нарушением регионарной микроциркуляции, изменением костного ремоделирования и индивидуальными особенностями пациентов с множественными переломами. Полученные данные свидетельствуют о необходимости индивидуализированного подхода к планированию хирургических и ортопедических вмешательств, строгого соблюдения протоколов асептики и динамического наблюдения в послеоперационном периоде.

Таким образом, рациональное сочетание малоинвазивных и открытых методов лечения, своевременная диагностика сопутствующих повреждений и учёт индивидуальных особенностей пациентов позволяют обеспечить эффективную стабилизацию костных структур, минимизировать послеоперационные осложнения и ускорить функциональное восстановление. Практическая значимость



Date: 17th July-2026

исследования заключается в возможности адаптации современных хирургических протоколов под конкретные клинические ситуации, что повышает качество оказания специализированной медицинской помощи, снижает риск неблагоприятных исходов и формирует основу для разработки персонализированных реабилитационных программ для пациентов с сочетанной травмой челюстно-лицевой области.

